

R.49: PRIMEIRO REGISTRO DE NIDIFICAÇÃO DE *Phaethon lepturus* DAUDIN, 1802 NO ARQUIPELAGO DOS ABROLHOS, BAHIA, BRASIL

M . A. EFE*; G. S. COUTO*; A. B. A. SOARES*; A. SCHULZ NETO**

A espécie ocorre regularmente no Mar das Antilhas e outros mares quentes. No Brasil, até então, havia registro para Fernando de Noronha, PE (Sick, 1985; Nacinovic & Teixeira, 1989), nidificando simpatricamente com seu congênere *P.aethereus*. Como parte do projeto "Estudos das aves marinhas dos Abrolhos" foram realizadas excursões para coleta de dados sobre a ecologia das aves nidificantes no arquipélago. Na excursão de janeiro de 1992 foi capturado o primeiro indivíduo de *P. lepturus* no arquipélago dos Abrolhos. Apresentava plumagem adulta e o bico de cor amarela. Dias depois foi capturado o segundo indivíduo, este, no ninho com um ovo. Apresentava plumagem adulta e o bico cor de laranja forte. Ambos foram anilhados, fotografados e soltos. Na excursão de março foram observados em vôo cinco indivíduos desta espécie, apresentando a maioria o bico cor de laranja forte. Sendo a população de Fernando de Noronha constituída somente por indivíduos de bico amarelo, pode-se sugerir que os indivíduos encontrados em Abrolhos pertencem a uma outra população. Quanto a variação na coloração do bico, a revisão bibliográfica se mostrou confusa com autores descrevendo a espécie com bico de cor amarela, amarela ou laranja e laranja. Concluímos então que o caráter em questão deve ser melhor estudado para que o status taxonômico destas aves seja reavaliado.

* Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UFRJ, Ilha do Fundão, CCS.

** Superintendencia do IBAMA-PE, Av. 17 de Agosto, 1057, Casa Forte, Recife, PE.