

*V Congresso Brasileiro de Ornitologia*

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

28 de janeiro a 02 de fevereiro de 1996

## AVES DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AIUABA, CE

Nascimento, J.L.X.; Schulz-Neto A.

IBAMA/CEMAVE, CP 04/34, 70312-970 Brasília, DF

A Estação Ecológica de Aiuaba localiza-se no município de Aiuaba, região dos Inhamuns, Ceará (06°35'-06°46'S; 40°08'-40°20'W) e apresenta uma área de aproximadamente 11.526 ha. Constitui-se em uma importante amostra de Caatinga, caracterizando-se geomorfologicamente por terrenos aplainados e serras baixas, intercalados com relevos acentuados e trechos acidentados, e vegetação hiperxerófila, adaptada à baixa disponibilidade de água. Conhecida por ser uma região tradicional de ocorrência de colônias de Avoantes *Zenaida auriculata*, as quais são fortemente pressionadas por caçadores comerciais, pouca ênfase tem sido dada ao estudo de suas aves. Com o objetivo de levantar informações sobre a composição avifaunística da região e seus aspectos biológicos, iniciamos em maio de 1994 um projeto específico para estes fins. Até agosto de 1995, foram realizadas três excursões a campo, incluindo as atividades práticas de dois cursos de anilhamento. Azevedo-Júnior (1994) relacionou 26 espécies de aves para a região. Até o presente, a lista preliminar das aves conta com 134 espécies, de 36 famílias, as quais foram identificadas através de visualização, capturas e vocalização. Já foram anilhadas 962 aves, de 46 espécies. Destacamos a ocorrência de *Aratinga cactorum* (Psittacidae), *Phaethornis gounellei* (Trochilidae), *Casiornis fusca* (Tyrannidae), *Thryothorus longirostris* (Troglodytidae), *Sericossypha loricata* e *Paroaria dominicana* (Emberizidae) como espécies endêmicas do Brasil. Vale mencionar ainda, o registro de um indivíduo de *Fregata magnificens* (Fregatidae) em 16 de junho de 1995, o que consideramos uma ocorrência acidental na área. Entre outras informações, serão apresentados os dados biológicos e biométricos das aves capturadas.