

V Congresso Brasileiro de Ornitologia

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

28 de janeiro a 02 de fevereiro de 1996

AVES DA FLORESTA NACIONAL DO ARARIPE, CE

Nascimento, J.L.X.

IBAMA/CEMAVE, CP 04/34, 70312-970 Brasília, DF

A Floresta Nacional do Araripe localiza-se na Chapada do Araripe, extremo sul do Ceará, abrangendo os municípios de Santana do Cariri, Crato, Barbalha e Jardim (07° 00' -07°30'S; 39° 00' -39° 45'W), com uma área de 38.262 ha. Apresenta uma média pluviométrica de 1.100 mm anuais e temperatura oscilante entre 15 e 25° C. O relevo é tabular, com cotas variando entre 840 e 920 m. A cobertura vegetal está caracterizada em Floresta Úmida Semi-Perenifólia (11,0% da área), Transição Floresta Úmida/Cerrado (48,5%), Cerrado (27,5%), Carrasco (1,5%) e Floresta Úmida Degradada pelo Fogo (11,5%). A região apresenta particularidades excepcionais, com a ocorrência de espécies típicas de diferentes formações, incluindo algumas endêmicas, ameaçadas de extinção ou insuficientemente conhecidas. D.M. Teixeira, em relatório não datado, relaciona 88 espécies e apresenta uma análise da importância da região. Durante levantamentos de campo realizados entre maio de 1994 e junho de 1995, incluindo atividades práticas de dois cursos de anilhamento, ampliamos a lista para 153 espécies, de 33 famílias. Até o presente, foram anilhadas 221 aves, de 41 espécies. Neste trabalho serão apresentados os dados biométricos e biológicos coletados até o momento, incluindo as observações sobre o Bico-virado-da-caatinga *Megaxenops parnaguae* (Furnariidae), espécie endêmica e considerada como ameaçada de extinção por alguns autores.