

526. SOBRE INTERMEDIÁRIOS ENTRE *Aratinga jandaya* e *Aratinga auricappilla*. (PSITTACIDAE, AVES). Yamashita, C. & Antas, P.T.Z. CEMAVE, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, DF.

Muitos autores já comentaram sobre a coespecificidade entre *Aratinga solstitialis* — margem esquerda do Amazonas, *Aratinga jandaya* — leste do PA, MA, PI, GO. *Aratinga auricappilla* — BA, MG, GO, SP, PR. Depositados no museu de Zoologia da UnB existem exemplares intermediários entre *A. auricappilla* e *A. jandaya*. Exemplares: N.º 092 — Sexo? — Culmen 22,7mm — Asa 16,6mm — Tarso 14,5mm — Cauda 12,5mm — 2-2-67 Indivíduo típico *A. jandaya* — Faz. Oliveira, Colinas — GO. N.º 093 — Sexo masc. — Culmen 22,2mm, Asa 16,2mm, Tarso 18,3mm, Cauda 12,2mm — 2-2-67. Possui verde nas auriculares com o papo amarelo — Faz. Oliveira, Colinas GO. N.º 370 — Sexo Fem. — Culmen 22,7mm — Asa 16,6mm — Tarso 14,4mm — Cauda 15mm. Apresenta caracter intermediário. Flores, GO, N.º 125 — Sexo Masc. — Culmen 24,8mm, Tarsô 14,4mm — Asa 15,8mm — Cauda 13,6mm — 23-7-67. Xavantina. A ocorrência de *A. auricappilla* em Xavantina é nova para a ornitologia. Apesar da coespecificidade creio ser melhor tratá-la distintamente pois parece não ser corrente os intermediários, e cromaticamente são bem distintos.