

ANÁLISE DOS DADOS DE ANILHAMENTO DE *Sterna hirundo* NA LAGOA DO PEIXE, TAVARES, RS

Paulo de Tarso Zuquim Antas

Nos últimos anos, muita atenção tem sido dada a *Sterna hirundo* nas suas áreas de internada. Dados já publicados informam sobre a situação Trinidad (BLOKPOEL et alii, 1982, 1984; ERWIN, 1986), Guyana e Suriname (BLOKPOEL et alii, op. cit.). No Brasil foi feita uma publicação das recuperações de *Sterna hirundo* anilhadas em outros países (LARA-RESENDE & LEAL, 1982) bem como observações sobre *Sterna hirundo* capturadas na Lagoa do Peixe em 1984 (HARRINGTON et alii, 1986).

Neste trabalho são analisados os dados de muda, peso e composição etária da amostra de 839 *Sterna hirundo* capturadas no Parque Nacional da Lagoa do Peixe, Município de Tavares, RS (31° 10' S 51° 00' W) período de Abril de 1985 a Abril de 1987, durante atividades desenvolvidas pelo IBDF no local. Os dados de recuperação de anilhas norte-americanas evidenciam a costa leste dos Estados Unidos, entre a Virginia e Massachusetts, como a área de origem destas aves. Esta distribuição abarca parte da área aonde a espécie sofreu grandes quedas populacionais entre 1835 e meados dos anos 70 (NISBET, 1983) estando praticamente estável ou sofrendo pequenas quedas no restante da área de origem das aves capturadas da Lagoa do Peixe, segundo o mesmo autor.

Embora BELTON (1984) considere como uma ave visitante pouco comum no Rio Grande do Sul, nossos dados indicam que a Lagoa do Peixe abriga até cerca de 12.000 *Sterna hirundo* em áreas de concentração de dormida, sendo também um local de muda e ganho de peso importante para a população internando no sul do continente.

Recebido em 14.07.87

Endereço do autor: CEMAVE
Caixa Postal, 04/034
70.000 — Brasília — DF

ANAI DO III ENAV	São Leopoldo	UNISINOS	1988	p. 95
-------------------------	---------------------	-----------------	-------------	--------------