

R132

Registro de variegação em marreca-piadeira, *Dendrocygna viduata*, coletada em Santa Vitória do Palmar, Rio Grande do Sul.

Leonardo Vianna Mohr

CEMAVE-IBAMA e PROAVES - Rua Miguel Teixeira 126, Porto Alegre, 90050-250, RS, leovmohr@portoweb.com.br.

A supressão parcial de pigmentação, em plumagem de aves, pode receber duas denominações, albinismo parcial ou variegação, consistindo em áreas de plumagem com padrão manchado, onde algumas penas não apresentam qualquer tipo de pigmento e as demais possuem coloração normal. Durante as atividades de coleta de dados do projeto de monitoramento de aves cinegéticas no Rio Grande do Sul, desenvolvido pelo Centro de Pesquisas para Conservação das Aves Silvestres (CEMAVE/IBAMA), participou-se de barreiras de fiscalização de caça, promovidas pelo IBAMA/RS, nas quais foram coletadas, basicamente, informações sobre espécie e número de aves abatidas e proporção sexual. Em uma barreira realizada em 06/09/1998, em Camaquã, obteve-se um espécime de marreca-piadeira, *D. viduata*, abatido na Fazenda Bela Vista, em Santa Vitória do Palmar, que apresentou um padrão de coloração aberrante nas penas centrais da região ventral, que eram totalmente brancas, ao invés do padrão barrado. Aparentemente, este é o primeiro registro do fenômeno, para a família Anatidae, no Rio Grande do Sul.

Órgão financiador: CEMAVE/IBAMA
